



ИНСТРУКЦИЯ  
по применению Сенсиблекса® Вейкс  
для регуляции родового процесса у коров и собак

(Организация-производитель «Veux-Pharma GmbH»/  
«Вейкс-Фарма ГмбХ», Германия)

#### I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Сенсиблекс® Вейкс (Sensiblex® Veux) лекарственное средство в форме раствора для инъекций, предназначенное для регуляции родового процесса у коров и собак.
2. Сенсиблекс® Вейкс в качестве действующего вещества содержит денаверина гидрохлорид (40,0 мг/см<sup>3</sup>), а также вспомогательные компоненты: бензиловый спирт (консервант), пропилен гликоль (растворитель), раствор соляной кислоты (для коррекции уровня pH), воду для инъекций.
3. По внешнему виду Сенсиблекс® Вейкс представляет собой бесцветную прозрачную жидкость.
4. Выпускают лекарственное средство в форме раствора для инъекций, расфасованным по 1; 2; 5; 10; 20; 30; 50; 100 и 200 см<sup>3</sup> в стеклянные флаконы соответствующей вместимости, закупоренные резиновыми пробками и закатанные алюминиевыми колпачками. Флаконы с лекарственным средством упаковывают в картонные коробки.  
Флаконы и коробки маркируют с указанием: названия и адреса организации-производителя, его торгового знака и адреса, названия лекарственного средства, названия и содержания действующего вещества, объема, показания к применению, способа применения, срока годности и условий хранения, надписей «Для животных», «Хранить в месте недоступном для детей», регистрационного номера, номера серии, даты изготовления и снабжают инструкцией по применению.
5. Хранят препарат с предосторожностью (список Б) в упаковке производителя, в сухом, защищенном от света месте, при температуре от 8 °С до 25°С.  
Срок годности при соблюдении условий хранения – 2 года со дня изготовления, после вскрытия флакона препарат можно использовать в течение 28 дней при соблюдении условий асептики.  
Препарат Сенсиблекс® Вейкс нельзя применять по истечении срока годности.

#### II. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

6. Входящий в состав препарата Сенсиблекс® Вейкс денаверин гидрохлорид представляет собой антиспазматическое средство. Он оказывает расслабляющее действие на гладкую мускулатуру шейки матки и способствует увеличению эластичности родовых путей. Кроме того, денаверин гидрохлорид обладает анестезирующим, легким транквилизирующим и жаропонижающим действием. Релаксация мышц сохраняется до нескольких часов, а анальгетическое действие - не более 90 минут. Наибольший фармакологический эффект наблюдается при его применении в конце фазы открытия родовых путей.
7. Денаверин гидрохлорид не обладает кумулятивными свойствами и выводится из организма животных в виде метаболитов в течение 24 часов.

#### III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

8. Сенсиблекс® Вейкс применяют для регуляции родового процесса у коров и собак (при недостаточном открытии или узости шейки матки, при неправильном положении плода, для активизации прерванных родов при слабой функции родовых путей, вызванной гипотонией матки, для ограничения риска повреждений родовых путей, а также фетотомии). В случае фетотомии требуется дополнительная эпидуральная анестезия.
9. Препарат Сенсиблекс® Вейкс вводят животным внутримышечно или подкожно в дозах:  
- первотелкам 5,0 – 10,0 см<sup>3</sup>/гол (200 - 400 мг/гол по ДВ);  
- коровам второго отела и старше - 10,0 см<sup>3</sup>/гол (400 мг/гол по ДВ);  
- собакам 0,5 – 1,5 см<sup>3</sup>/гол (20-60 мг/гол по ДВ) (возможно с 3 - 10 ед. окситоцина).  
Действие препарата Сенсиблекс® Вейкс начинается через 5 - 10 минут после введения и полностью проявляется в последующие 10 минут.  
В случае необходимости, инъекция Сенсиблекс® Вейкс может быть повторена после 40 - 60 минут в той же дозе.
10. При применении препарата Сенсиблекс® Вейкс животным в соответствии с Инструкцией побочных эффектов и осложнений не наблюдается.
11. Препарат Сенсиблекс® Вейкс не рекомендуется применять с другими лекарственными средствами, кроме окситоцина.
12. Применение препарата Сенсиблекс® Вейкс на ранней стадии родов не эффективно и назначение препарата в эти сроки неоправданно.
13. Мясо и молоко от коров после применения лекарственного средства Сенсиблекс® Вейкс можно применять в пищевых целях через 24 часа после последнего введения препарата.

#### IV МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

14. При работе с препаратом Сенсиблекс® Вейкс необходимо соблюдать общие требования безопасности, предъявляемые к работе с лекарственными средствами.
15. Препарат Сенсиблекс® Вейкс следует хранить в местах недоступных для детей.

Инструкция разработана ООО МП «ВЕТЕКС» (г. Москва) совместно с организацией-производителем фирмой «Вейкс-Фарма ГмбХ», Германия.  
(Адрес-организации-производителя: Veux-Pharma GmbH, Söhreweg 6, 34639 Schwarzenborn, Germany)

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГУ «ВГНКИ». Регистрационный номер ПВИ-2-4.6/01928

Версия 10/2006